

Ieda Maria BORTOLOTTTO^{1*}; Nathália Eberhardt ZIOLKOWSKI²; Rosane Juraci Bastos GOMES³; Fernanda Savicki de ALMEIDA⁴; Raquel Pires CAMPOS⁵; Camila AOKI^{1, 6}

¹Programa de Pós-Graduação em Biologia Vegetal, Instituto de Biociências. Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. (Cidade Universitária s/n – Bairro Universitário, CEP: 79070, Campo Grande, MS, Brasil. iedamaria.bortolotto@gmail.com)

²Ecoa – Ecologia e Ação. (Rua 14 de Julho, 3169 - Vila São Thomé, CEP: 79002-332, Campo Grande, MS, Brasil. nathalia@riosvivos.org.br

³Unicafes – União Nacional das Cooperativas da Agricultura Familiar e Economia Solidária (SDS, Ed. Conjunto Baracat, 27, salas 212-213, Asa Sul, CEP:70392-900, Brasília, DF, Brasil. rosane-bastos@hotmail.com)

⁴Fundação Oswaldo Cruz – FIOCRUZ Mato Grosso do Sul. Rua Gabriel Abrão, 92 – Bairro Jardim das Nações, CEP: 79081-746, Campo Grande, MS, Brasil. fernanda.savicki@fiocruz.br.

⁵Faculdade de Farmácia, Engenharia de Alimentos e Nutrição. Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Av. Costa e Silva, s/nº, Bairro Universitário, Campo Grande - MS 79070-900, Brazil. raquel.campos@ufms.br

⁶Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Câmpus de Aquidauana, R. Oscar Trindade de Barros, 740, Bairro Serraria, Aquidauana - MS, 79200-000, Brasil. camila.aoki@ufms.br